


Webinaire MT 71

ETRE **SST** EN PERIODE DE PANDEMIE A LA COVID 19 mai 2020




OBJECTIFS



Adaptation des conduites et gestes de secours pour éviter la propagation du virus selon les recommandations des autorités.



Révision interactive de l'action du SST, ne remplace pas un MAC SST (Maintien et Actualisation des compétences SST) ou une formation SST.



PREVENTION DE LA COVID 19

En mode dégradé, l'employeur conserve son obligation d'organiser les secours et d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

29/05/2020



PROTEGER de la COVID 19

OBJECTIF : limiter, si possible, les contacts entre la victime et le secouriste et renforcer les mesures d'hygiène

- Le SST respectera les consignes de secours applicables dans l'entreprise.
- Le SST portera les **gants** et si possible un **masque chirurgical** mis à disposition par son employeur.
- Dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à bien **se laver les mains** après l'intervention (et également après le retrait des gants).



En cas de détresse vitale, les gestes de secours ne devront pas être retardés par la mise en place des gants et du masque.

PROTEGER de la COVID 19



LA VICTIME REpond ET PRÉSENTE UN MALAISE AVEC SENSATION DE FIÈVRE OU/ET DES SIGNES RESPIRATOIRES (TOUX...),

Si l'entreprise en dispose, le SST demandera à la victime de s'équiper d'un masque.



ALERTER



PRISE EN CHARGE D'UN SALARIE POTENTIELLEMENT COVID19 (FIÈVRE, TOUX, ESSOUFFLEMENT...),

La conduite à tenir dépendra de son état et de la gravité des symptômes :

- si le salarié a du **mal à respirer ou a fait un malaise**, le SST devra **alerter les secours (le 15)**, conformément aux [préconisations ministérielles](#) ;
- si l'état de santé du salarié ne présente **pas de signes de gravité apparent (pas de malaise et pas d'essoufflement notamment)**, il prend contact avec **son médecin traitant**. Dans l'attente, **l'employeur l'isole des autres travailleurs** et lui fournit un masque (si l'entreprise en dispose).

EVACUATION



DU SALARIE POTENTIELLEMENT CONTAMINE A LA COVID19

Objectif: éviter toute contamination

Si le salarié est en mesure de regagner son domicile, l'employeur pourra, en concertation avec lui, l'autoriser à rentrer avec son véhicule personnel, s'il en a un ; à défaut, il pourra être envisagé de solliciter l'un ses proches, qui pourrait venir le chercher avec son propre véhicule ou l'accompagner, lors du trajet de retour à domicile.

Le cas échéant en faisant appel à un taxi (*rappelons que pour le transport public particulier de personnes, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit : l'interdiction pour les passagers de s'asseoir à côté du conducteur, l'aération obligatoire et permanente du véhicule, l'obligation pour les passagers d'emporter leurs déchets, l'obligation pour le conducteur de désinfecter le véhicule au moins une fois par jour*). Il s'agit, dans la mesure du possible, d'éviter les transports en commun et éviter d'encombrer les services d'urgence.

LIMITER LA PROPAGATION DU VIRUS



PROTECTION AVALE DE L'ENTREPRISE

Après la prise en charge de la personne, **prévenez le service de santé au travail et suivre ses consignes**, y compris pour l'hygiène du poste de travail et le suivi des salariés puis informez le supérieur hiérarchique.

Si le cas COVID est confirmé, organisez en lien avec le service de santé au travail les mesures à mettre en œuvre : balisage, identification des contacts, mise en quatorzaine des contacts...

EXAMINER

SI LE SST RECHERCHE DES SIGNES DE RESPIRATION

- le SST regarde si le ventre et/ou la poitrine de la victime se soulèvent.
- Il ne place pas sa joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime (conformément aux recommandations de l'ILCOR, International Liaison Committee on resuscitation, avril 2020)

29/05/2020





SECOURIR




SI LA VICTIME NE REPOND PAS ET NE RESPIRE PAS

- **Pour un adulte**, le SST pratique **uniquement les compressions thoraciques** (conformément aux recommandations de l'ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation, avril 2020),
- **Pour un enfant ou un nourrisson**, le SST pratique **les compressions thoraciques et le bouche-à-bouche** (conformément aux recommandations de l'ILCOR, avril 2020). **Ce dernier peut ne pas être réalisé en cas de traumatisme facial, de vomissements ou de répulsion de la part du SST.**
- **L'alerte des secours et l'utilisation du DAE sont inchangées.**

REVISION INTERACTIVE SST



PLAN D'INTERVENTION SST



PREVENTION



Compte tenu de cette situation de travail, répondez par vrai ou faux:




1. Ce salarié est en situation dangereuse.
2. En tant que SST je dois alerter mon collègue et sa hiérarchie de la situation dangereuse.
3. Des chaussures de sécurité et des gants lui permettraient de ne pas se blesser.

PREVENTION



Compte tenu de cette situation de travail,
réponses:

- ✓ 1. Ce salarié est en situation dangereuse.
- ✓ 2. En tant que SST, compte tenu de la situation, je dois alerter mon collègue et sa hiérarchie.
- ~~3. Des chaussures de sécurité et des gants lui permettraient de ne pas se blesser.~~



PROTEGER



En quoi consiste la protection dans cette situation ? Répondez par vrai ou faux:

1. Seule la victime est en danger.
2. La première chose à faire quand j'arrive en tant que SST est de supprimer le feu.
3. Dans cette situation je pratique un dégagement d'urgence de la victime.


PROTEGER




En quoi consiste protéger dans cette situation ?
Réponses:

- ~~1. Seule la victime est en danger.~~
- ~~2. La première chose à faire quand j'arrive en tant que sst est de supprimer le feu.~~
- ~~3. Dans cette situation je pratique un dégagement d'urgence de la victime.~~

PLAN D'INTERVENTION SST



EXAMINER



A quoi ça sert d'examiner? Répondez par vrai ou faux:

1. Transmettre les informations aux secours pour qu'ils puissent éventuellement intervenir.
2. Déterminer quelles actions de secours sont à mettre en place.
3. Déterminer l'ordre dans lequel le SST recherche les signes de détresse.
4. Je peux contrôler la respiration en collant mon oreille contre la bouche de la victime.


EXAMINER

A quoi ça sert d'examiner?
Réponses:


- ✓ 1. Transmettre les informations aux secours pour qu'ils puissent éventuellement intervenir,
- ✓ 2. Déterminer quelles actions de secours sont à mettre en place,
- ✓ 3. Déterminer l'ordre dans lequel le SST recherche les signes de détresse,
- 4. ~~Je peux contrôler la respiration en collant mon oreille contre la bouche de la victime.~~



PLAN D'INTERVENTION SST



ALERTER OU FAIRE ALERTER



Comment faciliter la prise en charge éventuelle des secours externes. Répondez par vrai ou faux:

1. Je dois répondre aux questions des secours au fur et à mesure plutôt que débiter mon message d'un bloc.
2. Je dois envoyer une personne accueillir les secours et organiser leur accès sur le lieu de l'accident, au plus près de la victime.
3. Le seul numéro à faire en cas d'accident est le 18.
4. En cas de d'une suspicion de la covid 19 , fièvre et toux, j'appelle tout de suite le 15.


ALERTER OU FAIRE ALERTE



Comment faciliter la prise en charge éventuelle des secours externes. Réponses:

- ✓ 1. Je dois répondre aux questions des secours au fur et à mesure plutôt que débiter mon message d'un bloc.
- ✓ 2. Je dois envoyer une personne accueillir les secours et organiser leur accès sur le lieu de l'accident, au plus près de la victime.
- ~~3. Le seul numéro à faire en cas d'accident est le 18.~~
- ~~4. En cas de d'une suspicion de la covid 19, fièvre et toux, j'appelle tout de suite le 15.~~

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME SAIGNE
ABONDAMMENT

SECOURIR


Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Quel est l'objectif? Choisir la bonne réponse:

1. Arrêter le saignement
2. Poser un garrot

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME SAIGNE
ABONDAMMENT

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Quel est l'objectif? Réponses:

✓ 1. Arrêter le saignement.



LA VICTIME S'ETOUFFE

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION




OBJECTIF: permettre à la victime de respirer.

Répondez par vrai ou faux:

1. Immédiatement après l'examen, je commence par les tapes dans le dos.
2. Si la victime perd connaissance, je pratique un massage cardiaque.

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME S'ETOUFFE


SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Réponses:

- ✓ 1. Immédiatement après l'examen, je commence par les tapes dans le dos.
- ✓ 2. Si la victime perd connaissance, je pratique un massage cardiaque.



LA VICTIME SE PLAINT
DE MALAISE

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



QUEL EST L'OBJECTIF? Eviter l'aggravation et prendre un avis médical

Réponses:

- 1. La victime présente soudainement des troubles du langage, j'appelle le 15 immédiatement.
- 2. Si l'état de la victime s'aggrave, je rappelle le 15.
- ~~3. Dès que quelqu'un se sent mal, en tant que SST je lui propose du sucre.~~
- 4. Si la victime présente de la toux ou/et de la fièvre, avant tout je lui propose un masque.



LA VICTIME SE PLAINT
DE BRULURES

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Quel est l'objectif? Eviter l'aggravation de la brûlure.

Répondez par vrai ou faux :



1 Dans cette situation, j'allonge la victime et je vais chercher de l'eau.



2 La victime s'est brûlée avec un produit étiqueté «corrosif », je rince en arrosant à l'eau courante tout en déshabillant la victime en me protégeant.

LA VICTIME SE PLAINT
DE BRULURES

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



- QUEL EST L'OBJECTIF? Eviter l'aggravation de la brûlure

Réponses:




~~Dans cette situation, j'allonge la victime et je vais chercher de l'eau.~~



La victime s'est brûlée avec un produit étiqueté «corrosif » donc je rince en arrosant à l'eau courante tout en déshabillant la victime en me protégeant.

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME SE PLAINT
DUNE DOULEUR
EMPECHANT
CERTAINS
MOUVEMENTS

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Quel est l'objectif? Eviter l'aggravation d'un traumatisme supposé

Répondez par vrai ou faux:

1. Suite à une chute de hauteur, mon collègue se plaint d'une douleur vive au cou et au dos, je dois stabiliser le rachis cervical.
2. Comme je l'ai trouvé au sol, la tête penchée sur le côté avant toute chose je lui replace la tête dans l'axe.
3. Pour une victime qui a reçu un coup sur la tête et présente des propos incohérents, il faut l'allonger, faire alerter et surveiller son état.
4. Si la victime présente une fracture de membre avec déplacement, je dois la réaligner.

LA VICTIME SE PLAINT
DUNE DOULEUR
EMPECHANT
CERTAINS
MOUVEMENTS

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



QUEL EST L'OBJECTIF? Eviter l'aggravation d'un traumatisme supposé

Réponses:



1. Suite à une chute de hauteur, mon collègue se plaint d'une douleur vive au cou et au dos, je dois stabiliser le rachis cervical.




~~2. Comme je l'ai trouvé au sol, la tête penchée sur le côté avant toute chose je lui replace la tête dans l'axe.~~

3. Pour une victime qui a reçu un coup sur la tête et présente des propos incohérents, il faut l'allonger, faire alerter et surveiller son état.

~~4. Si la victime une fracture de membre avec déplacement, je dois le réaligner.~~

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME SE PLAINT
D'UNE PLAIE QUI NE
SAIGNE PAS
ABONDAMMENT

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Quel est l'objectif? Eviter l'aggravation la plaie

Répondez par vrai ou faux:

1. Une morsure est considérée par défaut comme une plaie grave.
2. La conduite à tenir pour une plaie à l'œil est d'allonger la victime en lui recommandant de fermer seulement l'œil blessé et si possible lui maintenir la tête.
3. Pour les plaies simples, le bisou magique reste la référence.
4. Pour une plaie à l'abdomen le SST demande à la victime de s'allonger, jambes relevées.

LA VICTIME SE PLAINT
D'UNE PLAIE QUI NE
SAIGNE PAS
ABONDAMMENT

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION




Quel est l'objectif? Eviter l'aggravation la plaie. Réponses:

- 1. Une morsure est considérée par défaut comme une plaie grave.
- 2. ~~La conduite à tenir pour une plaie à l'œil est d'allonger la victime en lui recommandant de fermer seulement l'œil blessé et si possible lui maintenir la tête.~~
- 3. ~~Pour les plaies simples le bisou magique reste la référence.~~
- 4. ~~Pour une plaie à l'abdomen le SST demande à la victime de s'allonger, jambes relevées.~~



PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME NE
REPOND PAS MAIS
ELLE RESPIRE

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



QUEL EST L'OBJECTIF?

Répondez par vrai ou faux:

1. L'objectif est de lui permettre de continuer à respirer.
2. Le SST doit mettre en PLS la femme enceinte d'un côté particulier.
3. La technique de PLS du nourrisson est la même que pour l'adulte et l'enfant.
4. Pendant la durée des convulsions le SST ne touche pas la victime mais écarte tout objet dangereux. A la fin des convulsions il procède à l'examen et la met en PLS si nécessaire.

LA VICTIME NE
REPOND PAS MAIS
ELLE RESPIRE

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION




Quel est l'objectif?

Réponses:

1. L'objectif est de lui permettre de continuer à respirer.
2. ~~Le SST doit mettre en PLS la femme enceinte d'un côté particulier.~~
3. ~~La technique de PLS du nourrisson est la même que pour l'adulte et l'enfant.~~
4. Pendant la durée des convulsions le SST ne touche pas la victime mais écarte tout objet dangereux. A la fin des convulsions il procède à l'examen et la met en PLS si nécessaire.

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME NE
REPOND PAS MAIS
ELLE RESPIRE

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



1



2



3



7



4

6

5



LA VICTIME NE
REPOND PAS ET NE
RESPIRE PAS

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



Quel est l'objectif?

1. L'objectif est que la victime soit consciente avant l'arrivée des secours.
2. En période de pandémie, le défibrillateur demande de pratiquer 2 insufflations, le SST ignore le message et continue à masser l'adulte.
3. En cas de GASP, le SST ne doit surtout pas masser.
4. Même en cas d'amélioration de l'état de la victime, le SST ne doit pas retirer les électrodes de la poitrine de la victime ni éteindre le défibrillateur.

LA VICTIME NE
REPOND PAS ET NE
RESPIRE PAS

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION




• QUEL EST L'OBJECTIF?

- ~~1. L'objectif est que la victime soit consciente avant l'arrivée des secours.~~
- ✓ 2. Le défibrillateur demande au SST de pratiquer 2 insufflations, il ignore le message et continue à masser l'adulte parce qu'on est en période de pandémie.
- ✓ 3. ~~En cas de GASP, le SST ne doit surtout pas masser.~~
4. Même en cas d'amélioration de l'état de la victime, le SST ne doit pas retirer les électrodes de la poitrine de la victime ni éteindre le défibrillateur.

29/05/2020

PLAN D'INTERVENTION SST



LA VICTIME NE
REPOUND PAS ET NE
RESPIRE PAS

SECOURIR

Après
EXAMEN ET
PROTECTION



29/05/2020

SOURCES:

INRS:

- Manuel du formateur SST. 07/2015(réservé aux formateurs)
- Guides de données techniques V3. 06/2019 (donné à la demande lors de sessions de formation SST ou MAC SST)
- Aide mémoire SST ED 4085 (distribué systématiquement aux SST lors de sessions de formation SST ou MAC SST)
- <http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-sauvetage-secourisme-travail.html>

SITE GOUVERNEMENTAL :

- https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_conduite_tenir_suspicion.pdf

SITE MT 71:

- <https://www.mt71.fr/>

